

孙晓丽

审核无误

2022.08.10

马建华

2022.08.10

批准日期: 2007.05.27  
修改日期: 2009.09.24  
修改日期: 2010.10.01  
修改日期: 2012.10.01  
修改日期: 2014.11.17  
修改日期: 2017.12.21  
修改日期: 2020.04.16  
修改日期: 2020.09.20  
修改日期: 2021.09.24  
修改日期: 2022.08.08

## 安乃近片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

### 警示语

本品可能引起血液系统严重不良反应，如粒细胞缺乏症、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血等。本品还可能引起严重过敏反应，如重症药疹、过敏性休克等，请在医师的指导下使用本品，了解用药风险。本品一般不作为首选用药，仅在病情急重，且无其他有效药品治疗的情况下使用。本品禁用于 18 岁以下青少年儿童。

**【药品名称】**  
通用名称：安乃近片  
英文名称：Metamizole Sodium Tablets  
汉语拼音：Anaijin Pian

**【成 分】**  
主要成分：安乃近  
化学名称：[(1,5-二甲基-2-苯基-3-氧代-2,3-二氢-1H-吡唑-4-基)甲氨基]甲烷磺酸钠盐一水合物。  
化学结构式：  
CN1C=CC2=C1C(=O)N(C(=O)S(=O)(=O)[Na+])C(C)=C2

分子式: C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>NaNO<sub>3</sub>·H<sub>2</sub>O 分子量: 351.36

**【性 状】** 本品为白色或几乎白色片。

**【适 应 症】** 用于急性高热时的退热，也可用于急性疼痛的短期治疗，如头痛、偏头痛、肌肉痛、关节痛、痛经等。

**【规 格】** (1) 0.25g; (2) 0.5g。

**【用法用量】**  
0.25g 规格：口服 成人常用量：一次 0.5~1g (2~4 片)，需要时服 1 次，最多一日 3 次。应从最低有效剂量开始使用。  
0.5g 规格：口服 成人常用量：一次 0.5~1g (1~2 片)，需要时服 1 次，最多一日 3 次。应从最低有效剂量开始使用。

**【不良反应】**  
1. 皮肤损害：本品皮疹报道较多，如红斑疹、斑丘疹、荨麻疹、渗出性红斑、多型性红斑、水疱疹、剥脱性皮炎、皮肤溃疡坏死、急性泛发型发疹性脓疱疹、男性生殖器皮疹和瘙痒等，有重症多型性红斑、大疱性表皮松解症、皮肤坏死松解症的报道。  
2. 胃肠损害：本品可引起恶心、呕吐、胃部不适、胃痛、胃部烧灼感、胃肠胀气、腹部不适、腹痛、胃肠道出血、消化性溃疡出血等，有出血性坏死性肠炎的报道。  
3. 全身性损害：本品可引起眼睑、眼周、口腔、面部、生殖器等部位水肿，还可引起胸闷、憋气、呼吸困难、心悸、哮喘发作、急性喉水肿、血压下降，严重者出现过敏性休克，甚至导致死亡。  
4. 血液系统损害：本品可引起白细胞减少、粒细胞减少、粒细胞缺乏症、再生障碍性贫血、急性溶血性贫血、自身免疫性溶血性贫血、血小板减少性紫癜、鼻衄、过敏性紫癜等，有引起暴发性紫癜并导致死亡的报道。  
5. 泌尿系统损害：本品可引起血尿、肾功能异常，有急性肾功能衰竭的报道。  
6. 其他：可出现头昏、头痛、局部麻木等神经系统症状，有肝细胞损害、肝酶升高的报道。退热时可出现大汗和虚脱。

**【禁 忌】**  
1. 已知对本品过敏的患者。  
2. 服用阿司匹林或其他非甾体类抗炎药后诱发哮喘、荨麻疹或过敏反应的患者。  
3. 禁用于冠状动脉搭桥手术 (CABG) 围手术期疼痛的治疗。  
4. 有应用非甾体抗炎药后发生胃肠出血或穿孔病史的患者。  
5. 有活动性消化道溃疡 / 出血，或者既往曾复发溃疡 / 出血的患者。  
6. 重度心力衰竭患者。  
7. 妊娠晚期妇女禁用。  
8. 18 岁以下青少年儿童禁用。

**【注意事项】**  
1. 本品一般不作为首选用药，仅在病情急重，且无其他有效药品治疗的情况下短期使用。  
2. 本品引起的皮肤损害多见，严重者需要住院治疗。使用本品如果出现皮疹、瘙痒等反应，应立即停药，严重者应立即就诊。

3. 本品有可能引起过敏性休克风险。患者可出现胸闷、面部潮红、皮疹、呼吸困难、口唇发绀、大汗淋漓、血压降低、意识模糊、意识丧失等症状，甚至导致死亡。

4. 本品可引起粒细胞缺乏症。该症起病急，可能导致严重感染甚至死亡。患者表现为突发高热、极度乏力、周身不适，2~3 天内可能发生严重感染，如肺部、泌尿系统、口腔和皮肤感染等。出现上述症状须立即就诊并检查血象。

5. 避免与其他非甾体抗炎药，包括选择性 COX-2 抑制剂合用用药。

6. 根据抑制症状的需要，在最短治疗时间内使用最低有效剂量，可以使不良反应降到最低。

7. 在治疗所有非甾体抗炎药治疗过程中的任何时候，都可能出现胃肠道出血、溃疡和穿孔的不良反应，其风险可能是致命的。这些不良反应可能伴有或不伴有警觉症状，无论患者是否有胃肠道不良反应史或严重的胃肠道病史。既往有胃肠道病史（溃疡性大肠炎、克隆氏病）的患者应谨慎使用非甾体抗炎药，以免使病情恶化。当患者服用本品发生胃肠道出血或溃疡时，应停药。老年患者使用非甾体抗炎药出现不良反应的频率增加，其风险可能是致命的。

8. 针对多种 COX-2 选择性或非选择性 NSAIDs，药物持续时间达 3 年的临床试验显示，本品可能引起严重心血管血栓性不良事件、心脏病塞和中风的风险增加，其风险可能是致命的。所有的 NSAIDs，包括 COX-2 选择性或非选择性药物，可能有相似的风险。有心血管疾病或心血管危险因素的患者，其风险更大。即使既往没有心脏病史，医生和患者也应对此类事件的发生保持警惕。应告知患者严重心血管安全性的症状和体征以及如果发生应采取的步骤。

9. 和所有非甾体抗炎药（NSAIDs）一样，本品可导致新发高血压或使已有的高血压症状加重，其中的任何一种都可能导致心脏病事件的发生率增加。服用噻嗪类或髓袢利尿剂的患者服用非甾体抗炎药（NSAIDs）时，可能会影响这些药物的疗效。高血压病患者应慎用非甾体抗炎药（NSAIDs），包括本品。在开始本品治疗和整个治疗过程中应密切监测血压。

10. 有高血压和 / 或心力衰竭（如液体潴留和水肿）病史的患者应慎用。

11. NSAIDs，包括本品可能引起致命的、严重的皮肤不良反应，例如剥脱性皮炎、Stevens Johnson 综合征 (SJS) 和中毒性表皮坏死溶解症 (TEN)。这些严重事件可在没有征兆的情况下出现。应告知患者严重皮肤反应的症状和体征，在第一次出现皮肤皮疹或过敏反应的其他征象时，应停用本品。

**【孕妇及哺乳期妇女用药】**  
1. 妊娠早期和中期妇女不建议使用，妊娠晚期妇女禁用。  
2. 安乃近的代谢产物可进入乳汁，哺乳期妇女不宜应用。

**【儿童用药】** 本品禁用于 18 岁以下青少年儿童。

**【老年用药】**慎用。

**【药物相互作用】** 未进行该项实验且无可参考文献。

**【药物过量】** 未进行该项实验且无可参考文献。

**【药理毒理】**  
本品为氨基比林和亚硫酸钠相结合的化合物，易溶于水，解热、镇痛作用较氨基比林快而强。

**【药代动力学】** 口服吸收完全，于 2 小时内血药浓度达峰值，t<sub>1/2</sub> 约 1~4 小时。

**【贮 藏】** 遮光，密封保存。

**【包 装】**  
(1) 0.25g 规格：塑料瓶包装，100 片 / 瓶、1000 片 / 瓶。  
(2) 0.5g 规格：塑料瓶包装，100 片 / 瓶、1000 片 / 瓶，铝塑泡罩包装，2×15 片 / 板 / 盒、12 片 / 板 / 盒、40×12 片 / 板 / 盒；塑料薄膜包装，400 片 / 盒。

**【有 效 期】**  
塑料薄膜包装有效期：24 个月。  
塑料瓶、铝塑泡罩有效期：36 个月。

**【执行标准】** 中国药典 2010 版第一增补本。

**【批准文号】**  
(1) 0.25g 规格：国药准字 H37020631; (2) 0.5g 规格：国药准字 H37020632。

**【药品上市许可持有人】**  
**【生产企业】**  
企业名称：山东新华制药股份有限公司  
注册地址：淄博市高新技术产业开发区化工区  
邮政编码：255000  
电话号码：0533-2166666  
传真号码：0533-2184991  
网址：www.xinhuaomi.com

F

品名规格	安乃近 (高密)	改版项目	说明书	签字及日期
包装材质		版本号	F	
成品尺寸	90mm × 130mm	印刷颜色		
修订日期		字体	4.8 号，书宋	